



# Strategie di applicazione **Vite e Uva da tavola**

(Vite, Uva americana, Uva da tavola con semi e apirene)

**Tazero SP** - 2,0-4,0 L/ha

**Antym simplex** - 2,5-3 L/ha

**Manzic protect** - 2,0-4,0 L/ha

**NutriStar Energy** - 1-3 L/ha

**TRÏPTONITE®** - 0,7 L/ha



**Antym simplex** - 1,5-3 L/ha

**TRÏPTONITE®** - 0,7 L/ha

**NutriStar Energy** - 5 L/ha

In presenza di: **acari, afidi, ditteri, tripidi, lepidotteri, cocciniglie, oidio.**

In presenza di: Botrite, marciume acido.

In presenza di: **Peronospora, Mal dell'Esca, Marciume Nero.**

Efficienza di concimazione, fungicidi, insetticidi.

Allegagione, prevenzione acinellatura e cascola, sviluppo acini.

Sviluppo apparato radicale, efficienza di irrigazione e concimazione.

Efficienza di irrigazione, concimazione, fungicidi, insetticidi, nematocidi.

Applicazione FOGLIARE

Applicazione RADICALE

## Strategie di applicazioni Integrate

**Tazero** - 2,0 L/ha

Insetticida - dose minima da etichetta

**Manzic protect** - 2,0 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

**Antym simplex** - 2,5 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

**NutriStar Energy** - 1,0-2,0 L/ha

Fungicidi - Insetticidi - Erbicidi

In presenza di: **acari, afidi, ditteri, tripidi, lepidotteri, cocciniglie, cicaline, cimici, minatori fogliari, miridi, psilla.**

In presenza di: **peronospora, oidio, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi, ruggini, vaiolatura, batteriosi.**

In presenza di: **Monilia, Botrite, Sclerotinia, Stemphylium, Alternaria, Antracnosi, Brusone, Phoma, ruggini, marciume acido, batteriosi.**

Per migliorare assorbimento e velocità d'azione.