



Strategie di applicazione **Orticole** a foglia, radice, fusto, fiore, bulbo

(4a gamma, Aglio, Broccolo, Carota, Cavolfiore, Cavolo, Cipolla, Finocchio, Lattuga, Prezzemolo, Radicchio, Ravanello, Sedano, Spinacio.)

Tazero SP - 2,0-3,0 L/ha

Antym simplex - 2,5-3 L/ha

Manzic protect - 2,0-4,0 L/ha

NutriStar Energy - 1-3 L/ha

TRYPONITE® - 0,7 L/ha



Phytalex MZ - 5 L/ha

Antym simplex - 1,5-3 L/ha

NutriStar Energy - 5 L/ha

TRYPONITE® - 0,7 L/ha

In presenza di: **acari, afidi, aleurodidi, ditteri, tripidi, lepidotteri.**

In presenza di: **botrite, sclerotinia, batteriosi.**

In presenza di: **peronospora, alternaria, cladosporiosi, antracnosi septoria.**

Efficienza di concimazione, fungicidi, insetticidi.

Sviluppo vegetativo, accumulo sostanza secca, protezione stress.

In presenza di: **Fusarium, Phytophthora, Verticillium, Pythium, Rizoctonia, Sclerotinia.**

Efficienza di irrigazione, concimazione, fungicidi, insetticidi, nematocidi.

Sviluppo apparato radicale, efficienza di irrigazione e concimazione.

Applicazione FOGLIARE

Applicazione RADICALE

Strategie di applicazioni Integrate

Tazero - 2,0 L/ha

Insetticida - dose minima da etichetta

Manzic protect - 2,0 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

Antym simplex - 2,5 L/ha

Fungicida - dose minima da etichetta

NutriStar Energy - 1,0-2,0 L/ha

Fungicidi - Insetticidi - Erbicidi

In presenza di: **acari, afidi, ditteri, tripidi, lepidotteri, cocciniglie, cicaline, cimici, minatori fogliari, miridi, psilla.**

In presenza di: **peronospora, oidio, alternaria, cladosporiosi, septoria, antracnosi, ruggini, vaiolatura, batteriosi.**

In presenza di: **Monilia, Botrite, Sclerotinia, Stemphylium, Alternaria, Antracnosi, Brusone, Phoma, ruggini, marciume acido, batteriosi.**

Per migliorare assorbimento e velocità d'azione.